

Projet  
Centr'haies



Grâce au plan de relance et à l'appel à projet de la DRAAF, le réseau associatif FNE Centre-Val de Loire s'est associé à un collectif mené par Bio Centre afin de sensibiliser et accompagner les agriculteurs de la région à mener des opérations de plantation de haies sur leurs parcelles.

Fiche technique  
IBC – Les haies

Aide à la détermination :  
15 espèces communes des  
haies en région

## ❖ Trombinoscope de 15 espèces communes des haies en région Centre-Val de Loire

Lors de la plantation, il est rare que les plants aient encore des feuilles ou des fleurs. Il devient donc difficile de reconnaître les plants avec de simples rameaux ou bourgeons. Voici une série de photos pour vous aider à déterminer 15 essences communes des haies en région.

Source : Flore Del Rio



<b><i>Acer campestre</i> – Érable champêtre</b>		
Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Feuilles de petite taille et comportant cinq lobes arrondis et non dentés.	Opposés, globuleux, brun clair et poils laineux	Écorce des jeunes rameaux liégeuse, ocre à brun
<b><i>Crataegus monogyna</i> – Aubépine à un style</b>		
Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Vert clair, dentées au sommet, pennatifides, à 3-7 lobes profonds, écartés, entiers, dentés ou sublobés	Alternes, globuleux, bruns	Ocre à gris pâle, avec de grands aiguillons, jeunes rameaux souvent pubescents

### *Carpinus betulus* – Charme commun

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Ovales, doublement dentées en scie, disposées dans un plan, pointues et portées par un court pétiole, à limbe d'aspect gauffré	Alternes, sur deux rangs, écaille brun-vert, ovoïdes, pointus et allongés, appliqués contre le rameau	Jeunes rameaux poilus

### *Castanea sativa* – Châtaignier

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Étroites et allongées, alternes, longues (entre 10 et 30 cm), dentées	Alternes, sur deux rangs, un peu écartés, à 2 écailles très inégales	Jeunes rameaux canaliculés, anguleux, robustes, grisâtres

### *Quercus robur* – Chêne pédonculé

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
	 bourgeons en bouquet à l'extrémité du rameau	
Peu symétriques à pétiole court, limbes munis de deux oreillettes à la base, face supérieure vert foncé mat et inférieure claire.	Alternes, en spirale, latéraux ovoïdes, écartés du rameau, à plusieurs écailles, globuleux, pointus	Jeunes rameaux non anguleux

### *Cornus sanguinea* – Cornouiller sanguin

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Pointues, à pétiole court, ovales et bosselées dont les nervures convergent vers le sommet	Opposés, dépourvus d'écailles, appliqués contre le rameau, brun rouge et luisants, en forme de pointe de lance	Rouge foncé ou vert jaunâtre en situation ombragée, jeunes rameaux lisses ou presque, arrondis

### *Fraxinus excelsior* - Frêne commun

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
7-13 folioles ovales lancéolées, dentées en scie, sans poils et vert en dessus	Opposés, noirs, mats, nombreuses empreintes foliaires en fer à cheval	Rameaux épais, redressés à l'extrémité, noirs

### ***Euonymus europaeus* - Fusain d'Europe**

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Moyennes, de 4-0 cm de long, elliptiques ou ovales-lancéolées	Petits, verts appliqués contre le rameau ; opposés, écailleux	Rameaux tétragones (4 angles), verts

### ***Prunus avium* - Merisier**

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Alternes caduques et pendantes, grandes et dentées, pétiolées avec deux glandes rouges sur le pétiole à la base du limbe	Alternes, disposés en spirale écailles brun-rouge à bord échancré ondulé, en spirale, écartés du rameau, petits, ovoïdes	Jeunes rameaux sans poils et sans épines, lisses

### ***Corylus avellana* – Noisetier**

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Courtement pétiolées, suborbiculaires-acuminées (pointe allongée au bout de la feuille), doublement dentées, poilues	Alternes, sur 2deux rangs, un peu écartés, globuleux aplatis, les bourgeons floraux femelles sont munis de stigmates rouges	Rameaux flexibles/souples pubescents

<b><i>Juglans regia</i> – Noyer commun</b>		
<b>Feuilles</b>	<b>Bourgeons</b>	<b>Rameaux</b>
		
<b>Grandes (6 à 15 cm), alternes non dentées, composées et imparipennées (5 à 9 folioles ovales) ; la foliole terminale étant la plus grande.</b>	<b>Alternes, disposés en spirale, gros, globuleux et glabre gris foncé à brun</b>	<b>Gros, alternes présentant d'importantes cicatrices foliaires en écusson, à 3 empreintes</b>
<b><i>Pyrus communis subsp. pyraster</i> – Poirier sauvage</b>		
<b>Feuilles</b>	<b>Bourgeons</b>	<b>Rameaux</b>
		
<b>Ovales ou arrondies à la base, alternes, denticulées (dotées de petites dents) et longuement pétiolées (le pétiole est souvent plus long que le limbe). Le limbe est ovale ou arrondi à la base, mais terminé par une pointe au sommet.</b>	<b>Glabres, trapus à la base et terminant en pointes.</b>	<b>Jeunes rameaux brun clair ou parfois verdâtres, les rameaux latéraux étant souvent terminés par une pointe.</b>

### *Prunus spinosa* - Prunellier

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Petites, ovales, finement dentées et au pétiole plus court que le limbe.	Alternes, petits, bruns ou verts, rapprochés, souvent pubescents,	Rameau brun foncé doté de longues épines.

### *Sambucus nigra* - Sureau noir

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Composée de 5 ou 7 folioles ovales	Opposés, peu écartés, cicatrice foliaire importante, bruns, ovoïdes allongés et dotés de deux à quatre écailles	Rameaux opposés décussés, verruqueux à moelle blanche ; tronc flexueux et se crevassant fortement avec l'âge.

### *Ligustrum vulgare* – Troène commun

Feuilles	Bourgeons	Rameaux
		
Feuilles de 2 à 5 cm de long, lancéolées et comportant un pétiole court	Opposés, verts, appliqués le long du rameau, 1 empreinte foliaire	Jeunes rameaux verts et pubescents, arrondis à 4 angles